

128 X 550 mm (Back)

Tests sur la tuberculose : la prise d'OfoC 200 mg, comprimé pelliculé peut rendre faussement négatifs des résultats de tests de laboratoire concernant la recherche de la bactérie responsable de la tuberculose.

OfoC 200 mg, comprimé pelliculé avec des aliments et boissons

Sans objet

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifier une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

OfoC 200 mg, comprimé pelliculé ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

Administration de ce médicament fait contre-indiquer l'allaitement, en raison du passage du produit dans le lait maternel.

Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Attention au risque de contamination si vous avez une activité sportive intense (voir rubrique relative aux informations nécessaires avant la prise du médicament, Avertissements et Précautions).

Conduite de véhicules et utilisation de machines

En raison du risque de troubles neurologiques, avec notamment la survenue de vertiges, de somnolence, de troubles de la vue, vous devez être attentif à votre propre réaction au traitement avant de vous livrer à des occupations nécessitant une certaine vigilance, telles que la conduite d'un véhicule ou l'utilisation d'une machine.

Ofvo Carc 200 mg, comprimé pellicule coté du parabène

Ce médicament contient du parabène (dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide phénoxybenzoïque (E219)) qui peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Ofvo Carc 200 mg, comprimé pellicule coté du sodium

3. COMMENT PRENDRE Ofvo Carc 200 mg, comprimé pelliculé?

Votre médecin vous expliquera exactement comment prendre Ofvo Carc 200 mg, comprimé pelliculé. Vous devez prendre, à la même fréquence et pendant combien de temps. Ceci dépendra du type d'infection dont vous souffrez et de sa gravité. Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.

Poologie

Chez l'adulte

La posologie usuelle est de 400 mg/jour en 2 prises (1 comprimé 200 mg à 200 mg matin et soir).

Dans certains infections bactériennes, la posologie est de 400 mg/jour en une seule prise, soit 2 comprimés 200 mg en une seule prise.

La posologie peut dans certains cas nécessiter une posologie plus importante selon la sévérité de l'infection.

La posologie pourra être adaptée chez l'impuissant renal ou chez l'impuissant hepato.

Attreindre à la cabane de l'homme aux cornes! chez Enfant et chez l'adulte! (sans expirer) selon le poids du corps et de l'enfant.

Autre indication, la posologie est de 10 à 15 mg/kg par jour en deux prises quotidiennes, sans dépasser 400 mg par jour en deux prises.

Mode et voie d'administration
Voie orale.
Avaler les comprimés avec un peu d'eau.
Les comprimés sont à prendre à jeun ou au milieu du repas. Ne pas prendre **Ofloxac 200 mg, comprimé pelliculé** au même temps que des médicaments antacides (voir rubrique « Autres médicaments et **Ofloxac 200 mg, comprimé pelliculé** »).

Fréquence d'administration
1 à 2 prises par jour.
Si votre médecin vous a recommandé de prendre **Ofloxac 200 mg, comprimé pelliculé** en une seule prise par jour, il est préférable de prendre la prise le matin.

Durée du traitement
Pour votre traitement, ce médicament doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.
La disparition de la fièvre ou tout autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de mieux-être ne signifie pas que vous êtes guéri. Arrêtez le traitement dès que vous le sentez mieux. Le fait de cesser le traitement sans avis de votre médecin peut entraîner une aggravation de la maladie et retarder votre guérison.

Ne pas avoir pris plus de **Ofloxac 200 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû**
Consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien si vous avez pris plus de **Ofloxac 200 mg, comprimé pelliculé** que vous n'auriez dû.
Si une survenue et un traitement peuvent vous être proposés.

Si vous oubliez de prendre OfloxCare 200 mg, comprimé pelliculé
Ne prenez pas le dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre OfloxCare 200 mg, comprimé pelliculé
Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous remarquez un ou des effets indésirables comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Effets indésirables peu fréquents (entre 1 et 10 personnes sur 1 000 peuvent présenter les effets suivants) :

- infections dues à un champignon, germes (résistants aux antibiotiques, agissant, troubles du sommeil, difficulté à dormir,
- sensations de vertiges, maux de tête,
- irritation des yeux
- vertiges,
- toux, rhinopharyngite,
- douleurs au ventre, diarrhée, nausées, vomissements,
- démangeaisons, éruption cutanée.

Effets indésirables rares (entre 1 et 10 personnes sur 10 000 peuvent présenter les effets suivants) :

- réactions allergiques sévères (réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes, gonflement de la peau) (voir rubrique 2.2. Avertissements et précautions).

- pers. psychiques : psychotiques (par exemple impressions visuelles ou auditives non réelles (hallucinations), paranoïa), une modification de votre opinion ou de vos pensées (réactions psychotiques) avec un risque de pensées suicidaires ou de violence
- troubles de l'humeur : dépression, anxiété, troubles de l'humeur, sautes d'humeur, tristesse, confusion, cauchemars, dépression
- somnolence, sensation de picotements ou de fourmillements, troubles du goût, perturbation de l'odorat,
- troubles de la vue,
- baisse de la tension artérielle,
- rythme cardiaque rapide,
- difficultés respiratoires, gêne respiratoire,
- inflammation de l'intestin, par exemple avec du sang,
- élévation du taux d'enzymes mesurant le fonctionnement du foie, augmentation de la quantité de bilirubine (différentes substances présentes dans le sang)
- urticaire (éruption cutanée identique à celle provoquée par la piqûre d'ortie), bouffées de chaleur, transpiration excessive,
- éruption sur la peau au cours du sang,
- inflammation des tendons,
- augmentation de la créatinémie (mesure du fonctionnement du rein),
- augmentation du taux de sucre dans le sang entraînant un coma (hyperglycémie). Ceci est important pour les personnes

[illegible][illegible]

est effectuée afin que si serait pas patiente dans cette notice.

5. COMMENT CONSERVER Othos Care 200 mg, comprimé pellicule?

Tout ce médicament doit être conservé dans les conditions de conservation indiquées sur la notice.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la plaquette.

La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Conservez le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Néjetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec des ordures ménagères. Remarque : l'ensemble des médicaments que vous n'utiliserez plus, doivent être ramassés.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE AVEC DES TRES INFORMATIONS

Coque contient Othos Care 200 mg, comprimé pellicule

Chaque comprimé pellicule contient :

Othos USP 200 mg

Excipients qsp

• Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline (MCCP), amidon de maïs, empoids d'amidon de maïs, croscarmellose sodique (CCS), parabène (dégivrage), stéarate de magnésium, stéarate de calcium, stéarate de zinc, dihydroxyde de calcium (Lactitol), ... White opacifiant Film coating material ... dihydroxyde de calcium, un peu de paraffine.

Contient à effet notoire : parabène (dégivrage) de l'esther méthylique de l'acide hydroxybenzoïque (E219) et du sodium.

Qu'est-ce que Othos Care 200 mg, comprimé pellicule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé de forme ronde, biconvexe, et de couleur blanche et plein sur les deux faces.

Boule de 10 comprimés sous plaquette.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est: Mars 2022

Fabriqué exclusivement pour:

 **M&S**
Care

Fabriqué en Inde par:

Celebrity Biopharma Ltd.